

## TRIAGE DE ADMISIÓN – COVID 19

1 IDENTIFICAR	Identificar individuos con sintomatología respiratoria al ingreso al centro de salud preguntando sobre la presencia de los siguientes síntomas				
	FIEBRE	TOS	DOLOR DE GARGANTA	DIFICULTAD PARA RESPIRAR	ANOSMIA DISGEUSIA
	Considerar Nexo epidemiológico				
	La presencia de uno de ellos categorizará en este primer triage como <b>“Sintomático Respiratorio”</b>				
2 AISLAR	<b>Barbijo</b> (Ofrecer barbijo al paciente y asegurarse que se lo coloque correctamente). <b>Alcohol de gel</b> (Indicarle para que realice una adecuada higiene de manos). <b>Evitar contacto</b> con los demás pacientes.				
3 INFORMAR	<b>Circuito del paciente</b> → Aislar y dirigir al paciente respiratorio en forma diferenciada hacia el sector del <i>segundo triage</i> (triage de enfermería) y <i>consultorio de patología respiratoria aguda</i> . <b>Evitar la concentración de personas</b> en áreas comunes (sala de espera). <b>Paciente sin acompañantes</b> (salvo situaciones especiales).				

## 2- TRIAGE DE ENFERMERÍA – COVID 19

### PLANILLA DE CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES – COVID 19

Fecha y Hora	Lugar	Responsable		
DATOS DEL PACIENTE				
Apellido y Nombres	DNI	Edad	Domicilio	Teléfono

### CUADRO CLINICO (Signos y Síntomas)

1	Disnea		Fiebre	Tos	Odinofagia	Anosmia Disgeusia				
	Leve	Moderada	Severa	37,5°						
	Otros									
	Diarrea	Vómitos	Rechazo alimento	Artralgias	Mialgias	Dolor torácico	Malestar general	Cefalea	Inyección conjuntival	Irritabilidad / Confusión
	Fecha de inicio de los síntomas:									

### CONSTANTES VITALES

2	Frecuencia Cardíaca	Presión Arterial	Frecuencia Respiratoria	Saturación de Oxígeno	Temperatura	HGT Si corresponde

### NEXO EPIDEMIOLÓGICO

(Considerar los últimos 14 días y si corresponde de acuerdo con la dinámica epidemiológica)

3	* Contacto de casos confirmados COVID-19	Historial de viaje/residencia fuera del país o zona de transmisión local en el país	Diagnóstico de Neumonía previo	Es personal de salud o personal Esencial	Negativo

### ENFERMEDADES PRECIAS/COMORBILIDADES

4	Obesidad	Enf. Respiratoria (Asma/EPOC...)	Enf. Renal Crónica
	Diabetes	Tabaquista	HTA/ Insuficiencia Cardíaca
	Inmunodepresión	Enf. Neurológica	Embarazo/Puerperio
	Cáncer/Terapia oncológica	Enf. Hepática	Medicaciones:

### CONSIDERAR DETERMINANTES PSICO-SOCIALES

5	¿Vive solo? / Existe alguna otra situación que dificulte el seguimiento ambulatorio?

### CATEGORIZACIÓN

6	1-ROJO (EMERGENCIA)	2-AMARILLO (URGENCIA)	3-VERDE (SIN URGENCIA)
	Atención inmediata	Asistencia dentro de 60 minutos	Atención dentro de 120 minutos
	Signos y síntomas graves, descompensación, con amenaza de pérdida de la vida.	Presencia de síntomas, con signos estables, con factores de riesgo.	Estabilidad respiratoria, sin factores de riesgo
	Apnea Disnea grave Taquipnea Taquicardia/bradicardia Hipertermia Hipertensión arterial/hipotensión SpO2 <93% (con aire ambiente)	Disnea leve Vómitos y diarrea Cefalea Debilidad Respiración con tiraje Antecedente de factores de riesgo	Fiebre Tos Ardor de garganta Rinorrea